

	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	PG 04_M_01
	Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Malattie Infiammatorie Gastrointestinali Azienda ULSS 1 Dolomiti Ospedale di Feltre	
	INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALLA ESECUZIONE DI pH- IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA 24 ORE	Pag. 1 di 2

INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALLA ESECUZIONE DI pH-IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA 24 ORE

Signore/a

Nato/a a il

Residente a Via

Gentile Signore/a,

Lei dovrà essere sottoposto/a a procedura diagnostica di pH IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA 24 ORE. L'esecuzione di tale esame necessita di un Suo consenso, perché Lei possa, attraverso questo foglio informativo ed il colloquio con il medico, esprimere per iscritto la Sua decisione.

Informativa al paziente

La pH-impedenziometria esofagea è una metodica per lo studio accurato della malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE). L' esame consente di valutare la presenza di reflussi gastro-esofagei acidi e non-acidi, l'eventuale correlazione tra i reflussi ed i sintomi, il numero e l'estensione dei reflussi e la loro distribuzione temporale (notturno, diurno, post prandiale etc) nell'arco di 24 ore.

Questa procedura, di facile esecuzione, è indicata in caso di sintomi riferibili a MRGE, sia tipici (pirosi e rigurgito) che atipici (dolore toracico, tosse, laringite, asma) che non rispondono alla terapia standard con farmaci che bloccano la secrezione acida dello stomaco (inibitori di pompa protonica). Trova anche indicazioni prima di un intervento di chirurgia antireflusso.

Generalmente è sufficiente il digiuno da almeno 6-8 ore. Nella maggior parte dei casi l'esame deve essere eseguito previa sospensione da almeno due settimane di farmaci che agiscono sulla secrezione acida gastrica (pantoprazolo, omeprazolo, lansoprazolo, rabeprazolo, esomeprazolo, famotidina).

Normalmente il paziente prima di eseguire l'esame viene sottoposto a manometria esofagea, necessaria per il corretto posizionamento del catetere stesso. L'esame pH impedenziometrico prevede, quindi, il posizionamento di un catetere sottile, adeguatamente lubrificato, per via trans-nasale che il paziente dovrà tenere per circa 24 ore. Al paziente, prima di essere dimesso, viene consegnato un diario per riportare le attività svolte e i sintomi rilevati.

	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	PG 04_M_01
	Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Malattie Infiammatorie Gastrointestinali Azienda ULSS 1 Dolomiti Ospedale di Feltre	
	INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALLA ESECUZIONE DI pH- IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA 24 ORE	Pag. 2 di 2

La durata dell'esame è circa 24 ore, durante le quali il paziente potrà svolgere le normali attività quotidiane, compresi i pasti principali. Il giorno successivo, dopo circa 24 ore, il paziente tornerà presso l'ambulatorio di fisiopatologia dove verrà rimosso il sondino.

L'esame non può essere eseguito in sedazione in quanto è necessaria la collaborazione del paziente durante la procedura. Verrà eseguita un'anestesia locale orofaringea per migliorare la tolleranza all'esame. Non è necessario che il paziente sia accompagnato.

La pH-impedenziometria esofagea è un esame sicuro e generalmente ben tollerato. La procedura non causa dolore pur essendo fastidiosa, considerando la presenza del catetere a livello di naso e gola. Sono state descritte in letteratura rare complicanze legate alla procedura di posizionamento del sondino, minori (vomito, crisi vagale) o maggiori (episodi di broncospasmo, perforazione di un diverticolo esofageo). Pur essendo quest'ultime circostanze del tutto eccezionali, essendo potenzialmente pericolose per la vita, sono oggetto di pronto trattamento da parte del personale sanitario presente.

Io sottoscritto

confermo di aver preso visione delle informazioni di cui sopra e di aver avuto esaurienti spiegazioni da parte del medico. Esprimo liberamente il mio consenso a sottopormi all'esame.

Firma del/della Paziente Data

Il Medico ha verificato che il/la paziente ha compreso quanto illustrato.

Firma del Medico Data