



## AGOASPIRATI CON AGO SOTTILE E MICROBIOPSIE DELLA MAMMELLA CON GUIDA ECOGRAFICA

### *Scheda informativa*

Gentile Signora/e,

le seguenti informazioni sono necessarie per comprendere la procedura diagnostica a Lei proposta. Lei potrà rileggerle con calma ed il giorno dell'esame gli operatori saranno a Sua completa disposizione per ogni chiarimento.

#### ***Descrizione della procedura***

Un ago del calibro di pochi mm verrà introdotto con guida ecografica nella sede della lesione. Nel caso del semplice agoaspirato con ago sottile non sarà necessaria alcuna anestesia. Nel caso in cui si usino aghi di calibro maggiore, come nella microbiopsia, sarà eseguita anestesia locale ed eventuale piccola incisione della cute. Possono essere eseguiti multipli passaggi con l'ago nella lesione a giudizio dell'operatore. L'esame può durare 20-30 minuti.

#### ***Risultati attesi - alternative al prelievo***

L'esame citologico o istologico, eseguito sul materiale prelevato attraverso l'ago, permetterà una diagnosi accurata della Sua lesione in un'elevata percentuale di casi. L'alternativa alla microbiopsia è la biopsia chirurgica. Nelle lesioni a basso sospetto e con esame citologico negativo, può anche essere accettato il controllo periodico clinico-strumentale, dopo aver valutato il rischio delle conseguenze dell'eventuale ritardo diagnostico.

Se dopo il prelievo microbioptico il giudizio diagnostico conclusivo sarà di benignità, Le raccomanderemo solo controlli periodici.

#### ***Rischi della metodica***

Occasionalmente, durante l'esame, potrà avvertire un momentaneo dolore, dovuto alla stimolazione di qualche piccolo nervo, questa eventualità è poco frequente e non è prevedibile. Infezione, emorragia, puntura della pleura e passaggio d'aria nel cavo pleurico sono evenienze veramente rare; in ogni caso si tratta di lesioni ben curabili e non sono stati mai osservati danni permanenti.

Se sarà necessario attuare provvedimenti terapeutici Le saremo d'aiuto.

#### ***Probabili disturbi***

La posizione obbligata durante l'esame potrà causarLe un certo indolenzimento al collo ed alla spalla. Nei giorni successivi alla procedura potrebbero esserci modesti fastidi nell'area in cui è stato eseguito il prelievo. Nella stessa sede naturalmente si formeranno chiazze di colore blu-giallastro causate dalla diffusione di un po' di sangue sotto la pelle che scompariranno con il passare dei giorni. Nella sede del prelievo potrà formarsi una piccola raccolta di sangue (visibile con l'ecografia) che si riassorbe entro breve tempo.

La invitiamo comunque a riferirci ogni eventuale disturbo.

È necessario, inoltre, che prima del prelievo Lei avverta il Personale Medico e non Medico delle seguenti possibili condizioni:

**Direttore**  
Dr. Giovanni Balestriero

**Prenotazione/disdetta telefonica dell'appuntamento**  
800890500 da telefono fisso e cellulare



- Allergia ad anestetici
- Anomalie della coagulazione del sangue
- Terapie con farmaci anticoagulanti o con antiaggreganti piastrinici
- Recenti Interventi chirurgici importanti

***NB per l'Utenza esterna: Il giorno dell'esame presentarsi allo sportello dell'accettazione munito/a di impegnativa. Quest'ultima deve riportare chiaramente il quesito clinico.***

***Ricordarsi inoltre di portare in visione eventuali esami o visite effettuate in precedenza che abbiano attinenza con l'indagine in questione.***