	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	PG 16_M_02
	U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA OSPEDALE DI FELTRE AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI	
	INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALLA ESECUZIONE DI ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA	Pag. 1 di 2

## INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALL' ESECUZIONE DI ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA

### Che cos'è l'enteroscopia con videocapsula

L'enteroscopia con videocapsula (VCE) è la metodica endoscopica utile per esplorare il piccolo intestino (intestino tenue); prevede l'ingestione di una capsula monouso delle dimensioni di una grossa pastiglia (11 x 30 mm; come una pastiglia di antibiotico), su cui è installata una telecamera che esegue una ripresa cinematografica della superficie dei tratti esplorati. La VCE permette quindi di studiare quel lungo tratto di intestino compreso tra il duodeno (esplorabile con la gastroscopia) e il colon (studiato con la colonscopia). Il sistema di VCE si compone della capsula, di una cintura e di un computer con software dedicato per la visione e la refertazione del filmato. La cintura contiene una antenna (che capta il segnale radio inviato dalla capsula) e un registratore

### Informazioni riguardanti la procedura

Il mattino dell'esame le sarà posizionata la cintura contenente il registratore e deglutirà la capsula con un sorso d'acqua; potrà quindi lasciare il reparto, dove tornerà il giorno successivo per consegnare la cintura. Durante la giornata è preferibile camminare, per agevolare il transito della capsula, che è sospinta lungo l'intestino dalla gravità e dalla naturale peristalsi. Non ci si deve esporre a campi magnetici: eviti i metal detector delle banche e dei supermercati e non si sottoponga a risonanza magnetica. Controlli periodicamente il registratore sulla cintura: c'è una luce blu, che deve continuare a lampeggiare per tutta la durata della registrazione: se si interrompe annoti l'ora della interruzione.

Due ore dopo l'ingestione della capsula potrà bere acqua, eventualmente zuccherata (non bevande colorate); dopo 4-5 ore potrà assumere un pasto molto leggero (ad esempio un panino). Completato l'esame, controlli nei giorni successivi l'avvenuta espulsione della capsula nelle feci. Se dopo due settimane non è certo di aver espulso la capsula (o prima in caso di dolori addominali, o di ogni sintomo di rilievo) contatti la nostra Segreteria: le programmeremo una radiografia dell'addome per confermare l'espulsione. Fino a quando non è certo di aver espulso la capsula non si esponga a campi magnetici.

### Informazioni su cosa deve fare il paziente prima dell'esame

Nei 3 giorni precedenti l'esame deve essere assunta una dieta leggera, senza frutta o verdura (in particolare evitare semi, bucce – pomodoro compreso – e verdura a foglia larga).

La sera prima dell'esame si può assumere dieta liquida.


Dalle ore 19 iniziare l'assunzione del preparato per la pulizia dell'intestino, secondo le indicazioni descritte nel modulo "Preparazione per esecuzione di enteroscopia con videocapsula", che le è stato consegnato.

Attenzione ai farmaci a base di ferro, da sospendere almeno una settimana prima dell'esame, perché danno una colorazione brunastra al contenuto intestinale, ostacolando la visione.

Rimanere a digiuno completo la mattina dell'esame

### Rischi connessi con la procedura

Le complicanze della VCE sono rare: la ritenzione nell'intestino, che come detto, può essere causa di ostruzione intestinale e l'aspirazione nelle vie aeree durante la deglutizione. Il limite maggiore della tecnica è l'impossibilità di dirigere il transito della capsula: in un esame di diverse ore, possono essere rilevanti pochi fotogrammi, senza la possibilità di ottimizzare le condizioni di visione, né di eseguire biopsie.

	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	PG 16_M_02
	U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA OSPEDALE DI FELTRE AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI	
	INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALLA ESECUZIONE DI ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA	Pag. 2 di 2

### Indicazioni all'esecuzione della videocapsula endoscopica

- Sanguinamento gastrointestinale occulto (esofagogastroduodenoscopia e colonscopia negativa)
- Sospetta malattia di Crohn del piccolo intestino
- Sospette lesioni da utilizzo di antinfiammatori non steroidei (FANS)
- Studio poliposi intestinali
- Sospetta neoplasia del piccolo intestino
- Diarrea cronica di ndd

### Controindicazioni all'esecuzione della videocapsula endoscopica

- Sospetta occlusione intestinale
- Sindrome da allettamento e dismotilità intestinale
- Disfagia (controindicazione relativa, possibilità di utilizzare introduttore attraverso esofagogastroduodenoscopia)
- Diverticolo di Zenker
- Gravidanza (controindicazione relativa)

### CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, dichiara di aver letto attentamente e aver compreso le spiegazioni su quanto esposto nelle informazioni relative all'esame, di aver compreso le indicazioni e le modalità di esecuzione e di essere consapevole dei benefici e degli eventuali rischi/complicanze legate alla procedura.

Dichiara altresì di essere stato/a informato/a dal Dr./Dr.ssa \_\_\_\_\_  
In modo chiaro e comprensibile, che per il proprio stato clinico è opportuna l'esecuzione della procedura endoscopica proposta ed esprime il proprio consenso, consapevole e informato, ad essere sottoposto/a a **ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA**

Data \_\_\_\_\_

Firma del paziente \_\_\_\_\_

Firma del medico \_\_\_\_\_